

Val av odlingsväxt...




	Kummin	Koriander	Oljehampa
Växtlighet	Flerårig	Ettårig	Ettårig
Lämplig mullhalt	Låg-hög (mf-mmr)	Låg-medel (mf-mr)	Medel-hög (mh-mmr)
Gödsling	Cirka 50 kg N/ha	0-15 kg N/ha	50-80 kg N/ha
Såtidpunkt	Maj-juni	April-maj	Maj
Ogräshantering	Kemisk-mekanisk	Kemisk	Växtkonkurrens (Eko!)
Skadegörare	Kumminmal skördeåren	Inga kända	Hämpling (fågel)
Sjukdomar	Bomullsmögel	Inga kända	Bomullsmögel
Skördetidpunkt	Augusti-september	September-oktober	September-oktober
Torkning	Låg temperatur	Reglera luftmängd	Tvästegstorkning

Förfruktens påverkan på skörden

2016-2017

(växt inom) = färre än 100 mätningar totalt, men fler än 20 årligen

Förfruktens påverkan	>+8%	+8-4%	+4-0%	0--4%	>-4
Korn	Oljelin, sockerbeta	Böna, våraps, ärt, (kummin)	Vårrys, viltåker, råg, potatis, höstvet, (snabbvall, ggvall)	Vårvet, havre, vall, stubbtr, (bete, rättika)	Svartr, gröntr, NVÅ
Havre		Böna, våraps, korn, råg (rättika)	Vårvet, vårrys, höstvet, snvall, ggvall, stubbtr, ärt, svartr, (oljelin)	Bete, vall, gträda, NVÅ, viltåker	
Vårvet	Våraps, sbeta, bondböna, ärt, (kummin)	Råg, korn, stubbträda, vårrys, svarträda, (snabbvall, ggvall)	Grönträda, vårvet, havre, vall, NVÅ	(Viltåker)	
Höstvet	Böna, vårrys, ärt, våraps, (kummin, NVÅ)	Vall, korn, havre, svartr	Råg, stubbtr, gträda, vårvet, (rättika)		
Råg	Vårrys, grönträda, (gröngödslingsvall)	NVÅ, höstvet, (kummin, rättika)	Korn, stubbtr, vårvet, vall, svartr, (snvall)	Havre	
Oljevaxter	(Sbeta, böna, ärt)	Råg, korn, vårvet, havre, höstvet, (gträda)	(Grönträda)	Vall	
Ärt	Havre, vall, vårrys, korn, vårvet, (sbeta, gträda)	Höstvet	(Grönträda)		NVÅ
Bondböna		Råg, höstvet, korn, vårrys	Vårvet, vall	Havre	

Kontraktsodling

- För att dimensionera odling och försäljning på rätt nivå
 - Finlands marknadsandel av kummin är cirka 1/3
- Prisnivån beror på utbud och efterfrågan
- All kummin exporteras, i praktiken exporteras all koriander och största delen av oljehampan
 - Handel utanför EU görs i dollar

